


# MENINGITIS.




Calle 16C N° 19D-14 Barrio Dangond  
Correo: [cimcecorreo@gmail.com](mailto:cimcecorreo@gmail.com)  
Página web: [www.cimce.org](http://www.cimce.org)  
Tel: 5800126-5806696  
Valledupar-Colombia

# ¿QUÉ ES LA MENINGITIS?

✓ Es la inflamación de las meninges. Estas son unas membranas que cubren el cerebro.

✓ La enfermedad evoluciona muy rápido y puede ser mortal en menos de 24 horas o producir graves secuelas físicas y neurológicas.

Comportamiento de la enfermedad



# SÍNTOMAS



Fiebre repentina



Dolor de cabeza agudo



Visión doble



Náuseas, Vómitos



Fotosensibilidad



Rigidez de nuca



Erupciones cutáneas



# Causas de meningitis meningocócica

## ▶ *Neisseria meningitidis*

Existen por lo menos 12 tipos de *N. meningitidis*, llamados "serogrupos". Serogrupos A, B, C, W y Y causan la mayoría de las enfermedades meningocócicas


Personal en riesgo:

- Todas las personas sanas, pueden contraer meningitis por meningococo.
- Bebés menores de un año de edad.
- Adolescentes y adultos jóvenes de 16 a 23 años.
- Microbiólogos.



# ¿Cómo se disemina la meningitis por meningococo?

La bacteria se transmite por contacto directo con secreciones nasales o faríngeas como: Toser, besar, estornudar o compartir cubiertos.



# ¿ Cómo se puede prevenir la enfermedad?



Menactra®



- Ayuda a prevenir la enfermedad causada por serogrupos A, C, W y Y.
- En niños de 9 a 23 meses de edad, Menactra se administra en una serie de 2 dosis con una separación de al menos tres meses.
- Las personas de 2 a 55 años de edad reciben una dosis única.
- No administre este producto por vía intravenosa, subcutánea ni intradérmica.

# ¿ Cómo se puede prevenir la enfermedad?

## VA-MENGOC-BC®



- El esquema de vacunación consiste en dos dosis de 0,5 mL cada una, con un intervalo de 6 a 8 semanas de separación.
- La segunda dosis es imprescindible para lograr la protección. Este esquema es válido a partir de los 3 meses de edad en adelante.



## Curioso Dato



- En Colombia, durante el 2011 se presentó un brote de enfermedad causada por meningococo del serogrupo B, durante el cual se registró una letalidad del 50%
- Entre los años 2005 y 2011 se notificaron al SIVIGILA 1.065 casos de enfermedad por meningococo, lo que representó una incidencia promedio anual de 0,36 para casos notificados por cada 100.000 habitantes





# **CENTRO DE INVESTIGACIONES MICROBIOLÓGICAS DEL CESAR LIMITADA - CIMCE LIMITADA**

Calle 16C N° 19D-14 Barrio Dangond  
Correo: [cimcecorreo@gmail.com](mailto:cimcecorreo@gmail.com)  
Página web: [www.cimce.org](http://www.cimce.org)  
Tel: 5800126-5806696  
Valledupar-Colombia